



Cuidados en la Radiocirugía Intracraneal




Apreciado usuario (a): en este folleto usted encontrará recomendaciones que pueden ayudarle a manejar los efectos secundarios producidos por el tratamiento de radiocirugía intracraneal.

La radiocirugía intracraneal es un tratamiento con radioterapia de alta precisión para tratar diferentes tumores en la cabeza, así como malformaciones arteriovenosas, entre otros.



Para este tratamiento es necesario la colocación de una máscara de inmovilización sobre la cara, se recomienda que respire suavemente y permanezca tranquilo (a) durante la sesión.



Durante la sesión será monitorizado por cámaras, cada sesión durará entre 15 a 30 minutos.

Después de la radiocirugía intracraneal se pueden presentar algunos efectos secundarios que pueden variar de persona a persona:



- Dolor o sensación de “presión” en la cabeza.
- Debilidad o cansancio.
- Mareos.
- Náuseas o vómito.
- Caída del cabello.
- Enrojecimiento o descamación de la piel.
- Cambios en la visión (depende del área tratada).
- Cambios en la audición (depende del área tratada).
- Cambios en la memoria y la concentración (depende del área tratada).

Consejos prácticos



- Después de su radiocirugía intracraneal descanse en casa, no realice actividades que requieran esfuerzo físico.
- Recuerde tomar puntualmente los medicamentos para manejo en casa.
- Conviva con sus familiares de manera habitual, durante este tratamiento usted no emite radiación.
- Hidrátese la piel con la crema recomendada por el médico.



- Utilice un jabón suave para su higiene personal, seque la piel con toques evitando frotar la piel con la toalla.
- Utilice un champú suave y un cepillo de peinar de cerdas suaves.
- Proteja la piel del sol utilizando sombrilla y protector solar.
- En lo posible utilice rasuradora eléctrica para retirar el vello de la barba, esto con el fin de evitar cortaduras en la piel.
- Evite realizar actividades que requieran concentración como trabajos en tabletas, computadores o celulares.



- Manténgase en un ambiente tranquilo sin ruido.
- Hidrátese con líquidos de su preferencia (agua, suero, té, aromáticas o infusiones) evitando bebidas azucaradas o ácidas como naranja o limón.
- Evite alimentos fritos, picantes o muy condimentados prefiera una alimentación ligera o saludable. Coma en porciones pequeñas varias veces durante el día.
- Evite fumar o tomar bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
- Informe al personal de salud si ha presentado cambios en su estado salud.
- Asista a su cita de control con su médico radioterapeuta.



Nota: Después de terminar su radioterapia, es importante continuar con el cuidado de la piel durante un mes y seguir con las recomendaciones de dieta dadas por el personal de salud.

Consulte a su médico o enfermera(o) si presenta:

- Dolor intenso en la cabeza.
- Náuseas o vómito.
- Inflamación, enrojecimiento en la piel.
- Cambios en la visión o audición.



¿Cuándo acudir al servicio de urgencias?



- Dolor intenso en la cabeza.
- Convulsiones.
- Vómito en proyectil (es decir, sale disparado de la boca).
- Dificultad para hablar o caminar.
- Desmayo o pérdida conciencia.

A continuación, lo invitamos a dar clic en el siguiente botón para evaluar su comprensión de las orientaciones dadas.

Haz clic aquí



Para mayor información comuníquese al teléfono:

607 7000 300

Extensiones:

- **7019** Enfermería Radioterapia TomoTherapy
- **7020** Enfermería Radioterapia Truebeam
 - **7021** Consulta externa
 - **7011** Sala comandos Truebeam
 - **7015** Sala comandos TomoTherapy

**Centro de Cáncer y
enfermedades Hematológicas
Virgilio Galvis Ramírez**

#FoscalTeCuida



**[https://edufoscal.com
/comunidad/pacientes
cancerFI](https://edufoscal.com/comunidad/pacientes/cancerFI)**

