

Indicaciones de cuidado en casa

Postoperatorio Cirugía Urológica



Apreciado (a) Usuario (a), a continuación encontrará orientaciones dadas por el servicio de Cirugía de la Clínica Foscal Internacional para su cuidado en casa.



1.

Consuma dieta suave, no leche ni derivados por 48 horas; si presenta náuseas o vómito por efecto de la anestesia se recomienda tomar solo líquidos (agua, jugos, caldos claros), en poca cantidad e ir aumentando progresivamente.



2.

Tome los medicamentos ordenados por el médico para evitar dolor e inflamación por la cirugía y posibles complicaciones.

3.



Permanezca en reposo relativo o según indicación médica; por efecto de la anestesia se sentirá débil y mareado(a). Evite realizar movimientos que requieran fuerza. Durante las 24 horas siguientes a la cirugía, usted no puede manejar vehículos, operar máquinas y/o realizar actividades que requieran atención.

4.



Solicite ayuda para trasladarse (caminar, ir al baño) hasta su completa recuperación.



5.

Antes de cualquier manipulación de las heridas, lave muy bien sus manos con agua y jabón.



6.

Aumente la ingesta de agua de 2 a 3 litros por día.

7.

Acuda al servicio de urgencias si antes de su cita de control usted presenta:



A • Fiebre.



B • Dolor intenso que no calma con los analgésicos indicados.



C • Adormecimiento en extremidades.

D • Malestar general

E • Hematuria (orina con sangre) que no mejore con la ingesta abundante de líquidos.



8.

Solicite con tiempo la cita de control; asista a la hora y fecha indicada.

A continuación, lo invitamos a dar clic en el siguiente botón para evaluar su comprensión de las orientaciones dadas.

Haz clic aquí



Para mayor información comuníquese al teléfono:

607 7000300

Ext. 7111 - 7112 - 7110 - 7091

**Subdirección de
Apoyo Asistencial**

**Servicio de Cirugía
de Foscal Internacional**

#FoscalTeCuida



**www.edufoscal.com
/pacientescirugiaFI**

