

Cirugía de venas



Folleto educativo

Apreciado (a) Cuidador (a),
a continuación encontrará orientaciones
dadas por el Servicio de Cirugía de la
Clínica FOSCAL Internacional para su
cuidado en casa.



Recomendaciones:



Deambulaci3n temprana:
puede empezar a caminar al d3a
siguiente de la cirug3a

**M3nimo cada
2 horas**

Evite utilizar bast3n, muletas,
silla de ruedas y otros similares.



Cuidados con los vendajes

- A los tres d3as de la cirug3a, debe retirar los vendajes en casa, excepto los micropores (cintas adhesivas en la piel).
- Lave la pierna 3nicamente con agua y jab3n.
- No utilice productos como alcohol, Isodine, infusiones de hierbas ni otras soluciones.
- Col3quese las medias de compresi3n hasta la rodilla, con una presi3n de 15 a 20 mmHg, tal como lo indic3 su m3dico tratante.

3.




Cuidados de las heridas:
Evite manipular las heridas con las manos sucias.

Lave sus manos con agua y jabón corriente al menos 1 minuto antes de tocar sus heridas. Evite contacto con las mascotas.

4.

Manejo de hematomas:
Diluya un sobre de sulfato de magnesio en un litro de agua tibia y coloque paños irectamente sobre las zonas afectadas al menos 3 veces al día.



5.



Medicamentos:
Utilice solamente los prescritos en la fórmula médica de salida, no suspenda ninguno hasta terminar la última dosis.

6.

Signos de alarma:
Si presenta fiebre (temperatura mayor a 38°C), calor local, enrojecimiento, dolor no controlado, secreción de aspecto extraño (lechoso u olor fétido), consulte de inmediato al servicio de urgencias.



7.

Cita de control:
Recuerde tener presente la fecha y hora de su cita de control.



**Para mayor información
comuníquese a:**

**FOSCAL
Internacional**

607 7000300

**Por favor, haga clic aquí
para evaluar su entendimiento**



Subdirección de
Apoyo Asistencial

Servicio de Cirugía de
FOSCAL Internacional

[https://edufoscal.com/comunidad
/pacientescirugiaFI.html](https://edufoscal.com/comunidad/pacientescirugiaFI.html)

